

(甲类 OTC 标志、外用标志)

## 替硝唑阴道泡腾片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

### [药品名称]

通用名称：替硝唑阴道泡腾片

商品名称：替尼津

英文名称：Tinidazole Vaginal Effervescent Tablets

汉语拼音：Tixiaozuo Yindao Paotengpian

### [成份]

本品每片含替硝唑 0.2 克。辅料为预胶化淀粉、乳糖、十二烷基硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、酒石酸、碳酸氢钠、硬脂酸镁。

### [性状]

本品为类白色至微黄色片，表面可有轻微的隐斑。

### [作用类别]

本品为妇科用药类非处方药药品。

### [适应症]

用于滴虫性阴道炎。

### [规格]

0.2 克

### [用法用量]

阴道给药。将本品置于阴道后穹窿部，每晚 1 片，连用 7 日为一疗程。

### [不良反应]

偶见阴道局部灼热感。

### [禁忌]

- 对硝基咪唑类药物（如甲硝唑）过敏者禁用。
- 孕妇及哺乳期妇女禁用。

### [注意事项]

- 应于月经后重复使用一个疗程。
- 无性生活史的女性应在医师指导下使用。

- 3.使用本品时应避开月经期。
- 4.用药部位如有烧灼感、红肿等情况应停药，并将局部药物洗净，必要时向医师咨询。
- 5.给药时应洗净双手或戴指套或手套。
- 6.肝肾功能不全者慎用。
- 7.用药期间注意个人卫生，防止重复感染，使用避孕套或避免房事。
- 8.本品仅供阴道给药，切忌口服。
- 9.使用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。
- 10.如出现过敏反应、局部疼痛、头痛、头晕等不良反应，应停药就医。
- 11.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 12.本品性状发生改变时禁止使用。
- 13.请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 14.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

#### [药物相互作用]

如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

#### [药理作用]

本品为抗滴虫和抗厌氧菌药，对滴虫和大多数厌氧菌有抑制或杀灭作用。

#### [贮藏]

遮光，密封，阴凉（不超过 20℃）干燥处保存。

#### [包装]

双铝包装。

4 片/板，2 板/盒；

6 片/板，1 板/盒；

10 片/板，1 板/盒。

#### [有效期]

24 个月

#### [执行标准]

《中国药典》2010 年版二部

#### [批准文号]

国药准字 H20000208

#### [说明书修订日期]

2010年10月01日

**[生产企业]**

企业名称：苏州中化药品工业有限公司

生产地址：江苏省苏州高新区永安路66号

邮政编码：215151

电话号码：0512-68250075，66060668

传真号码：0512-68251514

网 址：[www.sccpc.com.cn](http://www.sccpc.com.cn)

**如有问题可与生产企业联系**