（乙类 OTC 标志）

对乙酰氨基酚颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

警示语：严重肝肾功能不全者禁用。

[药品名称]

通用名称：对乙酰氨基酚颗粒

英文名称：Paracetamol Granules

汉语拼音：Duiyixian anjifen keli

[成份]

本品每袋含主要成份对乙酰氨基酚 0.1 克。辅料为蔗糖、甘露醇、阿司巴坦、丙烯酸树脂、羟丙基甲基纤维素。

[性状]

本品为白色或类白色颗粒，味甜。

[作用类别]

本品为解热镇痛类非处方药药品。

[适应症]

用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

[规格]

0.1 克

[用法用量]

口服。12 岁以下儿童用量见下表：

年龄（岁）	体重（公斤）	一次用量(包)	一日次数
1-3	10-15	1~1.5	若持续发热或疼痛，可间隔 4-6 小时重复用药一次，24 小时内不超过 4 次。
4-6	16-21	1.5~2	
7-9	22-27	2~3	
10-12	28-32	3-3.5	

[不良反应]

偶见皮疹、荨麻疹、药热及粒细胞减少。长期大量用药会导致肝肾功能异常。

[禁忌]

严重肝肾功能不全者禁用。

[注意事项]

1. **本品为对症治疗药，用于解热连续使用不超过 3 天，用于止痛不超过 5 天，症状未缓解请咨询医师或药师。**
2. **1 岁以下儿童应在医师指导下使用。**
3. **对阿司匹林过敏者慎用。**
4. **不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。**
5. **肝肾功能不全者慎用。**
6. **服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。**
7. **对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。**
8. **本品性状发生改变时禁止使用。**

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 如正在使用其它药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

1. 应用巴比妥类（如苯巴比妥）或解痉药（如颠茄）的患者，长期应用本品可致肝损害。

2. 本品与氯霉素同服，可增强后者的毒性。

3. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用]

本品能抑制前列腺素合成，具有解热镇痛作用。

[贮藏]

密封，在阴凉（不超过 20℃）处保存。

[包装]

铝箔袋包装。0.1g/袋，每盒 6 袋。

[有效期]

36 个月。

[执行标准]

《中国药典》2005 年版二部

[批准文号]

国药准字 H19990011

[说明书修订日期]

2007 年 04 月 12 日

[生产企业]

企业名称：苏州中化药品工业有限公司

生产地址：江苏省苏州新区金山路 80 号

邮政编码：215011

电话号码：0512-68250075/68250041

传真号码：0512-68251514

网　　址：www.sccpc.com.cn

如有问题可与生产企业联系